

ETANERCEPT

GRUPO FARMACOLOGICO: Inmunosupresores selectivos. Grupo terapéutico: L04AA.

PRESENTACIÓN:

Enbrel vial de 25 mg + jeringa precargada con 1 ml de agua p.i.
Almacenar en nevera (+2°C a +8°C). No congelar.

RECONSTITUCIÓN:

Reconstituir el vial con 1 ml de agua p.i.
El agua p.i. debe ser introducida en el vial muy lentamente. Puede formarse un poco de espuma, lo cual es normal. Para evitar la formación de una cantidad excesiva de espuma, **no agitar** de forma vigorosa el vial, moverlo suavemente. En general la disolución completa de Enbrel se produce antes de 10 minutos. No deben emplearse ningún tipo de filtros en su preparación.

El vial reconstituido es estable 6 horas si se guarda en nevera (+2°C a +8°C)

ADMINISTRACIÓN

INYECCIÓN IV DIRECTA: NO.

INFUSIÓN INTERMITENTE: NO.

INFUSIÓN CONTÍNUA: NO

INYECCIÓN IM: NO

INYECCIÓN SC: SÍ.

SUEROS COMPATIBLES: Información no disponible

OBSERVACIONES:

-En los pacientes tratados con Enbrel, un 36 % presentaron reacciones en el sitio de inyección, que ocurrieron normalmente el primer mes. La duración media fue de 3 a 5 día. Para la mayoría de las reacciones no se requiere tratamiento. Algunos pacientes recibieron corticosteroides tópicos o antihistamínicos orales. Adicionalmente algunos pacientes desarrollaron reacciones en el sitio de inyección más reciente junto con la aparición simultánea de reacciones en sitios de inyección previos. Estas reacciones fueron, por lo general, transitorias y no recurrieron con el tratamiento.

(Ficha Diciembre 2002).