

# GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ORAL

Coordinadora: Olga Delgado

Autores: Olga Delgado, Iziar Martínez-López, Francesc Puigventós, Mercedes Cervera, Juan Sebastián Penalva, Amparo Sanchez, Gloria de Luna, Francisca Comas, Victor Llodrà, Ana Escriba, Jordi Ginés, Pere Ventayol, Jaume Serna, Mar Crespí, Manel Pinteño, Francisca Comas,

Documento actualizado Mayo 2003.

Información adicional de cada medicamento y bibliografía en la Intranet del hospital

MEDICAMENTO	RECOMENDACIÓN
ABACAVIR+LAMIVUDINA+ ZIDOVUDINA (TRIZIVIR)	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
ACEITE PARAFINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS PREFERENTEMENTE POR LA NOCHE AL ACOSTARSE ADMINISTRAR 6-8 VASOS DE AGUA AL DIA
ACENOCUMAROL	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL PREFERENTEMENTE EN AYUNAS, CON ALIMENTOS SI APARECE INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
ACETAZOLAMIDA	SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA MAÑANA SI SE DAN MAS DE UNA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR LA ULTIMA ANTES DE LAS 18-20 HORAS PARA NO INTERFERIR EL DESCANSO NOCTURNO
ACETILCISTEINA	MEZCLAR CON AGUA. ABUNDANTE INGESTA DE LIQUIDOS.
ACETILSALICILICO AC	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON UN VASO ENTERO DE AGUA INCORPORAR AL PACIENTE
ACICLOVIR	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
ALBENDAZOL	CON ALIMENTOS MEJORA BIODISPONIBILIDAD.
ALMAGATO	30 MIN DESPUES DE LAS COMIDAS/... Y AL ACOSTARSE
ALOPURINOL	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
ALPRAZOLAM	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
ALUMINIO HIDROXIDO	30 MIN DESPUES DE LAS COMIDAS/... Y AL ACOSTARSE
AMILASA+ LIPASA+ PROTEASA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
AMILORIDA+ HIDROCLOROTIAZIDA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA MAÑANA SI SE DAN MAS DE UNA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR LA ULTIMA ANTES DE LAS 18-20 HORAS PARA NO INTERFERIR EL DESCANSO NOCTURNO
AMINOCAPROICO ACIDO	LAS AMPOLLAS SE PUEDEN BEBER DIRECTAMENTE O MEZCLADAS CON AGUA, CALDO O LECHE
AMINOFILINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERENTEMENTE EN AYUNAS, CON ALIMENTOS SI APARECE INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
AMIODARONA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
AMITRIPTILINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL EN DOSIS UNICA ADMINISTRAR POR LA NOCHE
AMITRIPTILINA+ PERFENAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
AMLODIPINO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
AMOXICILINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
AMOXICILINA+ CLAVULANICO	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
ASCORBICO ACIDO	CON O SIN ALIMENTOS
ATENOLOL	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS
ATORVASTATINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
AZATIOPRINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
BACLOFENO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL

BENZOCAINA	DISOLVER EN LA BOCA
BETANECOL	EN AYUNAS PARA DISMINUIR LAS NAUSEAS
BEZAFIBRATO	INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAS COMIDAS
BICARBONATO SODICO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
BIPERIDENO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
BISACODILO	ADMINISTRAR EN AYUNAS PREFERENTEMENTE POR LA NOCHE AL ACOSTARSE ADMINISTRAR 6-8 VASOS DE AGUA AL DIA NO MASTICAR LOS COMPRIMIDOS NO ADMINISTRAR CON LECHE NI ANTIACIDOS
BISMUTO COLOIDAL CITRATO	20 MIN ANTES DE UNA COMIDA
BISOPROLOL	CON O SIN ALIMENTOS PREFERENTEMENTE POR LA MAÑANA
BROMOCRIPTINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
BUPRENORFINA	DISOLVER DEBAJO DE LA LENGUA NO MASTICAR NI TRAGAR
CALCIO	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SEPARAR 1-2 HORAS DE OTROS MEDICAMENTOS
CALCITRIOL	CON O SIN ALIMENTOS PERO SIEMPRE IGUAL ADMINISTRAR POR LAS MAÑANAS SEPARAR DE ANTIACIDOS O MEDICAMENTOS CON MG
CAPTOPRIL	EN AYUNAS
CARBAMAZEPINA	CON ALIMENTOS MEJORA LA BIODISPONIBILIDAD
CARBIMAZOL	REPARTIR LA DOSIS TOTAL EN 3 DOSIS AL DIA NO INFORMACION DE INTERACCION CON ALIMENTOS
CARBOCISTEINA	ANTES DE LAS COMIDAS
CARVEDILOL	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
CEFACLOR	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI APARECE INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
CEFALEXINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI APARECE INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
CEFUROXIMA AXETILO	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD Y DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL TRAGAR LOS COMPRIMIDOS ENTEROS
CETIRIZINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
CICLOFOSFAMIDA	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS POR LA MAÑANA , CON ALIMENTOS SI APARECE INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ABUNDANTE INGESTA DE LIQUIDOS DURANTE EL TRATAMIENTO
CICLOSPORINA	MEZCLAR CON LECHE O ZUMOS Y BEBER INMEDIATAMENTE ADMINISTRAR SIEMPRE EN LAS MISMAS CONDICIONES UTILIZAR VASO DE VIDRIO
CIPROFLOXACINO	INTERVALOS REGULARES PREFERIBLEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON UN VASO DE AGUA Y TOMAR VARIOS VASOS DE AGUA ADICIONALES A LO LARGO DEL DIA SEPARAR DE LA INGESTA DE ANTIACIDOS LECHE Y DERIVADOS
CIPROHEPTADINA	SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
CIPROTERONA	CON ALIMENTOS
CISAPRIDA	20 MIN ANTES DE LAS COMIDAS
CITRATO DE BISMUTO COLOIDAL	20 MIN ANTES DE LAS COMIDAS
CLARITROMICINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
CLINDAMICINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES (u.M) CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD ADMINISTRAR CON UN VASO DE AGUA PARA PREVENIR IRRITACION ESOFAGICA
CLOBUTINOL	DILUIR LAS GOTAS EN AGUA O TE
CLODRONATO SODICO	EN AYUNAS CON AGUA NO ADMINISTRAR CON LECHE NI ANTIACIDOS (SEPARAR AL MENOS 2 HORAS).
CLOMETIAZOL	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
CLOMIPRAMINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SE PUEDE PARTIR PERO NO MASTICAR
CLONAZEPAM	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES
CLONIDINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES LA DOSIS MAYOR, O SI SE PAUTA UNA VEZ AL DIA, ADMINISTRAR LA DOSIS POR LA NOCHE
CLOPIDOGREL	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS. SI APARECE INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL, ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
CLORAMBUCILO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS

CLORANFENICOL	EN AYUNAS Y CON UN VASO DE AGUA
CLORAZEPATO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
DIPOOTASICO	SI ES UNA SOLA DOSIS AL DÍA ADMINISTRAR POR LA NOCHE
CLORHEXIDINA+ BENZOCAINA	DISOLVER EN LA BOCA
CLOROQUINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE TOMA UNA VEZ A LA SEMANA HACERLO SIEMPRE EL MISMO DIA
CLORPROMAZINA	CON ALIMENTOS MEJORA LA BIODISPONIBILIDAD Y DISMINUYEN LOS EFECTOS GASTROINTESTINALES
CLORTALIDONA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA MAÑANA SI SE DAN MAS DE UNA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR LA ULTIMA ANTES DE LAS 18- 20 HORAS PARA NO INTERFERIR EL DESCANSO NOCTURNO
CLOTIAPINA	ADMINISTRAR LA DOSIS MAYOR ANTES DE ACOSTARSE
CLOXACILINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES EN AYUNAS Y CON UN VASO DE AGUA NO DAR CON ZUMOS DE FRUTAS NI BEBIDAS CARBONICAS
CLOZAPINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS ADMINISTRAR LA DOSIS MAYOR AL ACOSTARSE
CODEINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
COLCHICINA+ DICICLOVERINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
COLECALCIFEROL	CON O SIN ALIMENTOS PERO SIEMPRE IGUAL NO DAR CON ANTIACIDOS O MEDICAMENTOS CON MAGNESIO
COLESTIRAMINA	20 MIN ANTES DE LAS COMIDAS MEZCLAR CON AGUA O ZUMOS Y DEJAR REPOSAR UNOS MINUTOS ANTES DE ADMINISTRARLO PUEDE INTERFERIR CON LA ABSORCION DE OTROS MEDICAMENTOS
COTRIMOXAZOL	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON ALIMENTOS BEBER ABUNDANTES LIQUIDOS DURANTE EL TRATAMIENTO
DELAVIRDINA	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS. (Si se toma con alimentos deben evitarse las comidas de alto contenido graso). Separar al menos 1 hora de la toma de antiácidos o de ddl.
DEXAMETASONA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA UNA VEZ AL DIA DARLO POR LA MAÑANA
DEXCLORFENIRAMINA	TOMAR CON AGUA
DIAZEPAM	CON ALIMENTOS PARA MEJORAR LA BIODISPONIBILIDAD
DICLOFENAC	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL TOMAR CON UN VASO LLENO DE AGUA TRAGAR SIN MASTICAR
DIDANOSINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS ADMINISTRAR SIEMPRE LA DOSIS REPARTIDA EN 2 COMPRIMIDOS NO DAR CON ZUMOS O BEBIDAS CARBONICAS TOMAR CON AGUA
DIETA ENTERAL RICA EN GLUTAMINA	1 SOBRE EN 250 ML DE AGUA
DIETILCARBAMAZINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
DIFENHIDRAMINA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
DIGOXINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON O SIN ALIMENTOS PERO SIEMPRE IGUAL
DIHIDROCODEINA	SIN INFORMACION QUE CONTRAINDIQUE LA ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
DIHIDROERGOTAMINA	ABSORCION ORAL CASI NULA (<1%)
DILTIAZEM	CON ALIMENTOS NO MASTICAR LAS FORMAS RETARD
DIMENHIDRINATO	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
DIPIRIDAMOL	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
DISOPIRAMIDA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES
DOXAZOSINA	NO SE PUEDE FRACCIONAR
DOXICICLINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON ALIMENTOS Y UN VASO ENTERO DE AGUA INCORPORAR AL PACIENTE PARA EVITAR ESOFAGITIS NO ADMINISTRAR CON LECHE O ANTIACIDOS
EFAVIRENZ	PUEDE TOMARSE SIN TENER EN CUENTA EL HORARIO DE COMIDAS. Evitar la toma junto con comidas muy grasas. Se recomienda tomar al acostarse para paliar los efectos sobre el sistema nervioso central.
ENALAPRILLO	CON ALIMENTOS
ERGOTAMINA + CAFEINA	SIN INFORMACION QUE CONTRAINDIQUE LA ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
ERITROMICINA ETILSUCCINATO	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERENTEMENTE EN AYUNAS, SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL

	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS NO ADMINISTRAR CON ZUMOS O BEBIDAS CARBONICAS
ESPIRAMICINA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
ESPIRONOLACTONA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA MAÑANA SI SE DAN MAS DE UNA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR LA ULTIMA ANTES DE LAS 18-20 HORAS PARA NO INTERFERIR EL DESCANSO NOCTURNO
ESTAVUDINA	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS PERO TAMBIEN PUEDE TOMARSE CON LAS COMIDAS
ESTRAMUSTINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS NO ADMINISTRAR CON LECHE NI ANTIACIDOS
ETAMBUTOL	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
ETOPOSIDO	ADMINISTRAR EN AYUNAS CON UN VASO DE AGUA
FENELZINA	EVITAR ALIMENTOS RICOS EN TIRAMINA (QUESO, VINO, CAVIAR) Y BEBIDAS CON BASES XANTICAS (CAFE, TE, COLAS, CHOCOLATE)
FENITOINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD
FENOBARBITAL	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON O SIN ALIMENTOS PERO SIEMPRE IGUAL SI SE DA EN DOSIS UNICA HACERLO POR LA NOCHE
FENOTEROL	CON ALIMENTOS
FENOXBENZAMINA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
FERROGLICINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS
FINASTERIDE	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
FITOMENADIONA	CON ALIMENTOS AUMENTA LA ABSORCION ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES
FLECAINIDA	LOS ALIMENTOS NO INTERFIEREN SIGNIFICATIVAMENTE SU ABSORCION
FLUCONAZOL	PREFERIBLEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
FLUDROCORTISONA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
FLUORURACILO	LAS AMPOLLAS SE PUEDEN BEBER MEZCLAR LAS AMPOLLAS CON ZUMO
FLUOXETINA	CON O SIN ALIMENTOS PERO SIEMPRE IGUAL ADMINISTRAR UNA SOLA DOSIS POR LA MAÑANA O 2 DOSIS POR LA MAÑANA Y AL MEDIODIA
FLURAZEPAM	ADMINISTRAR UNA VEZ AL DIA 30-60 MIN ANTES DE ACOSTARSE
FLUTAMIDA	CON ALIMENTOS
FLUVOXAMINA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
FOLICO ACIDO	20 MINUTOS ANTES DE LAS COMIDAS
FOLINICO ACIDO	20 MINUTOS ANTES DE LAS COMIDAS
FOSFATOS	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y EL EFECTO LAXANTE TOMAR ABUNDANTE INGESTA DE LIQUIDOS DURANTE EL TRATAMIENTO
FOSFESTROL	SIN INFORMACION QUE CONTRAINDIQUE LA ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
FOSFOSODA	ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAS COMIDAS. ADMINISTRAR 6-8 VASOS DE AGUA AL DIA.
FUROSEMIDA	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS, CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA MAÑANA SI SE DAN MAS DE UNA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR LA ULTIMA ANTES DE LAS 18-20 HORAS PARA NO INTERFERIR EL DESCANSO NOCTURNO
GABAPENTINA	SEGUIR SIEMPRE MISMO ESQUEMA HORARIO
GANCICLOVIR	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
GLIBENCLAMIDA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
GRISEOFULVINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS, ESPECIALMENTE GRASOS, AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD Y DISMINUYEN LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
GUANFACINA	CON O SIN ALIMENTOS SI ES UNA DOSIS UNICA AL DIA ADMINISTRAR AL ACOSTARSE
HALOPERIDOL	SI SE MEZCLAN LAS GOTAS CON AGUA BEBER INMEDIATAMENTE. NO MEZCLAR CON TE NI CAFE PORQUE SE FORMAN PRECIPITADOS INSOLUBLES CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
HEXETIDINA	ENJUAGUES
HIDRALAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA MAÑANA SI SE DAN MAS DE UNA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR LA ULTIMA ANTES DE LAS 18-20 HORAS PARA NO INTERFERIR EL DESCANSO NOCTURNO
HIDROCLOROTIAZIDA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA MAÑANA SI SE DAN MAS DE UNA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR LA ULTIMA ANTES DE LAS 18-20 HORAS PARA NO INTERFERIR EL DESCANSO NOCTURNO

HIDROCORTISONA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA UNA VEZ AL DIA DARLO POR LA MAÑANA
HIDROXICINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
HIDROXIUREA	SI DIFICULTAD PARA TRAGAR LAS CAPSULAS ABRIR Y MEZCLAR CON AGUA
HIERRO	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS, CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON UN VASO DE AGUA NO DAR CON LECHE NI DERIVADOS LACTEOS. NO DAR CON ANTIACIDOS NI TETRACICLINAS
IBUPROFENO	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
IMIPRAMINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE DA UNA SOLA DOSIS AL DIA ADMINISTRAR AL ACOSTARSE
INDINAVIR	AYUNAS (Al menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas principales. Puede tomarse junto a alguna comida ligera (*))
INDOMETAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON UN VASO DE AGUA
ISONIAZIDA	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL NO TOMAR CON ANTIACIDOS CON ALUMINIO CON QUESOS Y PESCADOS PUEDEN CAUSAR REACCIONES INDESEABLES
ISONIXINA	SIN INFORMACION QUE CONTRAINDIQUE LA ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
ISOSORBIDA MONONITRATO	EN AYUNAS Y CON UN VASO DE AGUA
ITRACONAZOL	CON ALIMENTOS PARA AUMENTAR LA BIODISPONIBILIDAD NO ADMINISTRAR CON ANTIACIDOS O ANTIHISTAMINICOS H2
JOSAMICINA	EN AYUNAS Y CON UN VASO DE AGUA
KETOCONAZOL	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD NO ADMINISTRAR CON ANTIACIDOS O ANTIHISTAMINICOS H2
KETOROLACO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
KETOTIFENO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
LABETALOL	CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD
LACTIOL	CON ALIMENTOS
LACTULOSA	CON UN VASO LLENO DE AGUA PREFERENTEMENTE EN AYUNAS PERO TAMBIEN PUEDE TOMARSE CON ALIMENTOS
LAMIVUDINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
LAMOTRIGINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
LEVAMISOL	SIN INFORMACION QUE CONTRAINDIQUE LA ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
LEVODOPA + CARBIDOPA	FORMA NORMAL: PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL EVITAR ALIMENTOS RICOS EN PROTEINAS QUE DISMINUYEN LA ABSORCION LA FORMA RETARD SE PUEDE ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
LEVOFLOXACINO	PUEDE TOMARSE CON LAS COMIDAS O EN AYUNAS
LEVOMEPRIMAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
LEVOTIROXINA	EN AYUNAS ADMINISTRAR UNA VEZ AL DIA POR LA MAÑANA
LIOTIRONINA	VER: LEVOTIROXINA
LISURIDA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
LITIO	CON ALIMENTOS DISMINUYE EL EFECTO PURGANTE Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD
LOMUSTINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS Y CON UN VASO LLENO DE AGUA PREFERENTEMENTE AL ACOSTARSE
LOPERAMIDA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS DESPUES DE CADA DEPOSICION DIARREICA
LOPINAVIR-RITONAVIR	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
LORAZEPAM	SI SE DA UNA VEZ AL DIA ADMINISTRAR AL ACOSTARSE
LORMETAZEPAM	SI SE DA UNA VEZ AL DIA ADMINISTRAR AL ACOSTARSE
LOSARTAN POTASICO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
MAGNESIO HIDROXIDO	ADMINISTRAR CON 2 VASOS DE AGUA PARA EVITAR DESHIDRATACION ADMINISTRAR AL ACOSTARSE TOMAR 6-8 VASOS DE AGUA ADICIONALES DURANTE EL DIA
MAPROTILINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE DA UNA VEZ AL DIA ADMINISTRAR AL ACOSTARSE
MEBENDAZOL	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD
MEDROXI- PROGESTERONA	CON O SIN ALIMENTOS CON LIQUIDOS ABUNDANTES
MEGESTROL	ADMINISTRAR EN AYUNAS
MELFALAN	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL INGESTA ABUNDANTE DE LIQUIDOS DURANTE EL TRATAMIENTO
MERCAPTOPYRINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS INGESTA ABUNDANTE DE LIQUIDOS DURANTE EL TRATAMIENTO

MESALACINA	TRAGAR ENTEROS SIN MASTICAR PARA QUE LIBEREN EL PRINCIPIO ACTIVO EN COLON NO ADMINISTRAR CON MEDICAMENTOS QUE MODIFIQUEN EL pH INTESTINAL CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
METADONA	CON AGUA O ZUMOS
METAMIZOL	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL Y NO INTERFIERE LA ABSORCION
METFORMINA	CON ALIMENTOS
METILCELULOSA	ADMINISTRAR CON 2 VASOS DE AGUA O LIQUIDO FRIO PARA EVITAR OBSTRUCCION INTESTINAL ADMINISTRAR DURANTE EL DIA 6-8 VASOS DE AGUA
METILDIGOXINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS
METILDOPA	CON ALIMENTOS DISMINUYEN LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
METILERGOMETRINA MALEATO	TRAGAR O PONER BAJO LA LENGUA
METILPREDNISOLONA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA UNA VEZ AL DIA DARLO POR LA MAÑANA
METIRAPONA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
METOCLOPRAMIDA	20 MIN ANTES DE LAS COMIDAS Y AL ACOSTARSE
METOCARBAMOL	SE PUEDE ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
METOPROLOL	CON ALIMENTOS MEJORA LA BIODISPONIBILIDAD
METOTREXATE	EN AYUNAS
METRONIDAZOL	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERENTEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
MEXILETINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON ABUNDANTES LIQUIDOS Y EL PACIENTE INCORPORADO PARA EVITAR ESOFAGITIS
MIANSERINA	SI SE DA UNA DOSIS AL DÍA ADMINISTRAR AL ACOSTARSE
MICOFENOLATO MOFETILO	ADMINISTRAR EN AYUNAS
MIDECAMICINA	EN AYUNAS
MISOPROSTOL	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
MOCLOBEMIDA	EVITAR ALIMENTOS RICOS EN TIRAMINA
MOLSIDOMINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
MORFINA	CON ALIMENTOS MORFINA RETARD: CON O SIN ALIMENTOS PERO SIEMPRE IGUAL . TRAGAR SIN MASTICAR
NAFTIDROFURILO	SIN INFORMACION QU E CONTRAINDIQUE SU ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
NAPROXENO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL CON UN VASO ENTERO DE AGUA
NELFINAVIR	CON ALIMENTOS (Con el estómago lleno, es decir al finalizar la comida o dentro de la primera hora después de comer)
NEOMICINA	20 MIN ANTES DE LAS COMIDAS ABSORCION INTESTINAL CASI NULA
NEOSTIGMINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL NO MASTICAR
NEVIRAPINA	PUEDE TOMARSE SIN TENER EN CUENTA EL HORARIO DE COMIDAS
NICARDIPINO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
NIFEDIPINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD DE LA FORMA RETARD EN CASO DE ACCESO DE ANGINA DE PECHO MASTICAR SIN TRAGAR PARA SU ABSORCION SUBLINGUAL
NIMODIPINO	EN AYUNAS TRAGAR SIN MASTICAR
NISTATINA	ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAS COMIDAS Y MANTENER EN LA BOCA ANTES DE TRAGAR
NITROFURANTOINA	CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD Y DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL A INTERVALOS REGULARES
NITROGLICERINA	PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANGINA DE PECHO ADMINISTRAR SUBLINGUALMENTE
NORFLOXACINO	EN AYUNAS Y CON UN VASO DE AGUA ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES NO ADMINISTRAR CON LECHE NI DERIVADOS LACTEOS
OLANZAPINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
OMEPRAZOL	EN AYUNAS SI SE ADMINISTRA UNA VEZ AL DIA HACERLO POR LA MAÑANA
ONDANSETRON	20 MIN ANTES DE LA QUIMIOTERAPIA, 4 Y 8 HORAS DESPUÉS. ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
OXIBUTINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
OXIMETOLONA	SIN INFORMACION QU E CONTRAINDIQUE SU ADMINISTRACION CON ALIMENTOS

PANCREATINA	ADMINISTRAR CON LAS COMIDAS NO ABRIR LAS CAPSULAS PUES PRODUCEN IRRITACION BUCAL
PARACETAMOL	EN AYUNAS PARA UNA RAPIDA ACCION
PARACETAMOL + CODEINA	VER: PARACETAMOL
PARAFINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS
PAROMOMICINA	CON ALIMENTOS
PAROXETINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
PENICILAMINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS
PENTOXIFILINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
PERFENAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
PERGOLIDA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
PIPEMIDICO ACIDO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
PIRAZETAM	SIN INFORMACION QU E CONTRAINDIQUE SU ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
PIRAZINAMIDA	EN AYUNAS
PIRIDOSTIGMINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SIN INFORMACION QUE CONTRAINDIQUE SU ADMINISTRACION CON ALIMENTOS
PIRIDOXINA	NO MASTICAR
PIRIMETAMINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL NO MASTICAR
PIROXICAM	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
POLIESTIRENOSULFONAT O CALCICO	MEZCLAR CON AGUA
POTASIO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON UN VASO ENTERO DE AGUA Y EL PACIENTE INCORPORADO PARA EVITAR ESOFAGITIS NO ADMINISTRAR CON LECHE
PRazosin	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
PREDNISOLONA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA UNA VEZ AL DIA DARLO POR LA MAÑANA
PREDNISONA	CON ALIMENTOS PARA DISMINUIR LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL SI SE ADMINISTRA UNA VEZ AL DIA DARLO POR LA MAÑANA
PRIMAQUINE	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA
PROBENECID	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL TOMAR 6-8 VASOS DE AGUA AL DIA DURANTE EL TRATAMIENTO
PROCARBAZINA	EVITAR ALIMENTOS RICOS EN TIRAMINA (QUESO, VINO , CAVIAR) EVITAR BEBIDAS CON BASES XANTICAS (CAFE, TE, COLA, CHOCOLATE)
PROPAFENONA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES CON O SIN ALIMENTOS PERO SIEMPRE IGUAL, YA QUE LOS ALIMENTOS AUMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE SU ABSORCION
PROPRANOLOL	CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD
QUETIAPINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
QUINIDINA SULFATO	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERIBLEMENTE EN AYUNAS, CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL NO ADMINISTRAR CON ANTIACIDOS
RANITIDINA	CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD SI SE ADMINISTRA EN DOSIS UNICA DAR POR LA NOCHE
RETINOL	CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD (3,6)
RIBAVIRINA	CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD
RIFAMPICINA	PREFERIBLEMENTE EN AYUNAS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL ADMINISTRAR CON ALIMENTOS SEPARAR 12 H DE LA ADMINISTRACION DE PAS
RISPERDAL	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
RITODRINA	CON O SIN ALIMENTOS SEGUIR ESTRICTAMENTE LA PAUTA PRESCRITA
RITONAVIR	PREFERENTEMENTE CON ALIMENTOS
ROFECOXIB	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
ROPINIROL	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
SALBUTAMOL	SIN INFORMACION QUE CONTRAINDIQUE SU ADMINISTRACIÓN CON ALIMENTOS
SAQUINAVIR	CON ALIMENTOS (Con el estómago lleno, es decir al finalizar la comida o dentro de la primera hora después de comer)
SENOSIDOS	ADMINISTRAR SEGUN PROTOCOLO DE RADIOLOGIA
SERTRALINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
SIMVASTATINA	ADMINISTRAR CON ALIMENTOS
SODIO SULFATO (SOL. EVACUANTE BOHM)	RECONSTITUIR 1 SOBRE CON 250 ML AGUA
SOTALOL	EN AYUNAS
SUCRALFATO	20 MIN ANTES DE LAS COMIDAS PARA PROTEGER LA MUCOSA GASTRICA ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERIBLEMENTE EN AYUNAS , CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
SULFADIAZINA	ABUNDANTE INGESTA DE LIQUIDOS DURANTE EL TRATAMIENTO

SULFASALAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL (DAR 8 VASOS DE AGUA AL DIA DURANTE EL TRATAMIENTO)
SULPIRIDE	ADMINISTRAR EN AYUNAS NO ADMINISTRAR CON ANTIACIDOS
TACROLIMUS	ADMINISTRAR EN AYUNAS
TAMOXIFENO	ADMINISTRAR EN AYUNAS
TAMSULOSINA	NO MASTICAR
TEOFILINA	ADMINISTRAR A INTERVALOS REGULARES PREFERIBLEMENTE EN AYUNAS, CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
TIAMINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
TIAPRIDA	CON ALIMENTOS AUMENTA LA BIODISPONIBILIDAD
TICLOPIDINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
TIETILPERAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
TIOGUANINA	ADMINISTRAR EN AYUNAS LIQUIDOS ABUNDANTES DURANTE EL TRATAMIENTO
TIORIDAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
TOCOFEROL	CON ALIMENTOS
TOPIRAMATO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
TORASEMIDA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
TRAMADOL	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
TRANEXAMICO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
TRAZODONA	CON ALIMENTOS DISMINUYEN LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL AUNQUE DISMINUYE LA BIODISPONIBILIDAD
TRIAMTERENO	CON ALIMENTOS MEJORA LA BIODISPONIBILIDAD Y DISMINUYEN LOS EFECTOS SECUNDARIOS
TRIFLUOROPERAZINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL EVITAR CAFEINA
TRIFLUSAL	CON ALIMENTOS
TRIHEXIFENIDILO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL TRAGAR SIN MASTICAR NO ADMINISTRAR CON ANTIACIDOS
UREA <sup>13</sup> C	EL PACIENTE DEBE ESTAR EN AYUNAS 6H ANTES DE LA APLICACIÓN (PREFERIBLEMENTE LA NOCHE ANTERIOR).
URSODESOXICOLICO, ACIDO	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
VALPROICO ACIDO	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL NO ROMPER NI MASTICAR
VENLAFAXINA	CON ALIMENTOS DISMINUYE LA INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL
VERAPAMILO	LAS FORMAS DE LIBERACION NORMAL ADMINISTRAR PREFERIBLEMENTE EN AYUNAS Y CON ALIMENTOS SI INTOLERANCIA GASTROINTESTINAL LAS FORMAS RETARD ADMINISTRAR CON ALIMENTOS PARA EVITAR FLUCTUACIONES PLASMATICAS
VIGABATRINA	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
VITAMINA C	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
VITAMINA B1-B6-B12	ADMINISTRAR CON O SIN ALIMENTOS
VORICONAZOL	ADMINISTRAR EN AYUNAS
ZALCITABINA	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS PERO TAMBIEN PUEDE TOMARSE CON ALIMENTOS
ZIDOVUDINA	PREFERENTEMENTE EN AYUNAS (Al menos 30 minutos antes o 1 hora después de las comidas) PERO TAMBIEN PUEDE TOMARSE CON ALIMENTOS
ZOPICLONA	ADMINISTRAR UNA VEZ AL DIA ANTES DE ACOSTARSE

#### Referencias:

##### Fichas técnicas de los medicamentos

Delgado O, Puigventós F, Serra J: Administración de medicamentos vía oral. Medicina Clínica (Barc) 1997;108:426-35.

USP DI Advice for the patient. Drug information in lay language ( 14 ed) Vol 2. Rockville. Maryland. The United States Pharmacopeia Convention. Inc 1994.

Drugdex Editorial Staff EN: Gelman CR, Rumack BH, editoriales. Drugdex information system . Micromedex Inc, Denver Colorado.

Torrecilla A, Benitez T, Gonzalez L, Garcia B: Medicamentos ¿En ayunas o con alimentos?. EL Farmaceuticos Hospitales 1994, 47:32-34



Medication Teaching Manual: A guide for patient counseling (5 ed ) American Society of Hospital Pharmacist. 1991

Roca M, Masso J, Codina C, Ribas J, Isamat E: Guia de administración d emedicamentos. Servicio de Farmacia. Hospital Clinic i Provincial de elona. elona. Consulta SA 1992

ZIAC for hypertension .MedLetter Drugs Ther 1994, 36: 23-24

Catalogo de especialidades farmacéuticas. Madrid. Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmaceuticos

American Hospital Formulary Service, en McEvoy GK ed. Drug Information. Bethesda. ASHP

AMA Drug evaluations Annual . American Medical Association

Neuvonen PJ The clinical significance of food-frug interactions, a review. Med J Australia 1989: 150: 36-40

Fraga MD, Pintor MR, Bermejo MT, de Juana P, García B. Guía para la administración de medicamentos. Servicio de Farmacia. Hospital Severo Ochoa. ELA Editorial 1997.