

CASPOFUNGINA ACETATO

GRUPO FARMACOLOGICO: Antimicóticos vía sistémica. Grupo terapéutico: J02AX04.

PRESENTACIÓN:

Caspofungin MSD vial de 50 mg.
Caspofungin MSD vial de 70 mg.
Almacenar vial en nevera (entre +2 °C y +8 °C).

RECONSTITUCIÓN:

Sacar el vial de la nevera y esperar hasta que alcance temperatura ambiente. Reconstituir el vial con 10,5 ml de SF y agitar suavemente. Si se ha empleado el vial de 70 mg se obtiene una solución de 7 mg/ml; si se ha empleado el vial de 50 mg se obtiene una solución de 5 mg/ml. No se debe usar si se observa turbidez.
Estabilidad del vial reconstituido **1 hora a temperatura ambiente** ó 48 h en nevera (+2 °C a +8 °C). Desde el punto de vista microbiológico no se recomienda guardar más de 24 horas.

ADMINISTRACIÓN

INYECCIÓN IV DIRECTA: NO.

La solución intravenosa de caspofungina nunca se debe administrar mediante inyección intravenosa rápida o en bolus.

INFUSIÓN INTERMITENTE: SÍ.

Diluir la dosis prescrita en 250 ml de SF y administrar lentamente en 1 hora. La solución de perfusión es estable durante 24 h a T^a ambiente o 48 h a +2 °C y +8 °C. En pacientes con restricción de líquidos la dosis prescrita puede diluirse en 100 ml de SF. La posología usual es dosis única diaria, 70 mg el primer día y 50 mg/24h los días siguientes.

INFUSIÓN CONTINUA: NO

INYECCIÓN IM: NO

SUEROS COMPATIBLES: SF y Ringer Lactato. **No emplear SG5%.**

OBSERVACIONES.

No mezclar ni infundir conjuntamente con otros medicamentos.
No es necesario ajustar dosis en insuficiencia renal.
Disminuir la dosis de mantenimiento a la mitad en caso de insuficiencia hepática moderada.
Mantener dosis de 70 mg/día en pacientes de más de 80 Kg.
En general el tratamiento debe seguir durante al menos 7 días después de la desaparición de los síntomas.

(Revisado Mayo 2003, según Ficha Técnica Octubre 2001).